

da acidez.

2 - CONTRAINDICAÇÕES:

Pessoas alérgicas aos componentes da fórmula.

3 - PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS:

Doses excessivas podem provocar perturbações gastrointestinais como náuseas, regurgitações, vômitos e diarreia.

4 - INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS:

Os antiácidos podem reduzir a absorção de certos fármacos particularmente tetraciclina, fenitoína, digoxina, agentes hipoglicêmicos e antagonistas H₂. Desta forma, GASTROGEL[®] deve ser administrado pelo menos uma hora antes ou depois da administração destes medicamentos.

5 - POSOLOGIA:

CRIANÇAS: 1 a 2 comprimidos mastigáveis ao dia, de acordo com a idade.

ADULTOS: 2 a 4 comprimidos mastigáveis, 4 vezes ao dia.

6 - Superdosagem:

Na eventualidade da ingestão acidental de doses muito acima das preconizadas, recomenda-se adotar as medidas habituais de controle das funções vitais.

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

Registrado por: MEDQUÍMICA INDÚSTRIA FARMACÉUTICA LTDA
Rua Otacilio Esteves da Silva, 40
Granjas Betânia - CEP 36.047-400 - Juiz de Fora - MG
CNPJ 17.875.154/0001-20
Indústria Brasileira

Fabricado por: MEDQUÍMICA INDÚSTRIA FARMACÉUTICA LTDA
Rua Fernando Lamarca, 255
Distrito Industrial - CEP 36.092-030 - Juiz de Fora - MG
CNPJ 17.875.154/0003-91
Indústria Brasileira

VENDA SEM PRESCRIÇÃO MÉDICA
MS nº 1.0917.0038
Farm. Resp.: Dr. Jadir Vieira Junior
CRF-MG 10.681

SAC: 0800 032 4087
www.medquimica.com
sac@lupin.com

Uma empresa do Grupo Lupin
Cód. 9370-4



Uma empresa do Grupo Lupin
Cód. 9370-4

GASTROGEL[®]

hidróxido de alumínio
hidróxido de magnésio
simeticona

Comprimido mastigável

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

1 - NOME GENÉRICO:

hidróxido de alumínio, hidróxido de magnésio, simeticona.

2 - FORMA FARMACÉUTICA E APRESENTAÇÃO:

Comprimidos mastigáveis em embalagem contendo 20 comprimidos.

USO ADULTO E PEDIÁTRICO

3 - COMPOSIÇÃO

CADA COMPRIMIDO CONTÉM:

| | |
|----------------------------|--------------|
| hidróxido de alumínio..... | 200 mg |
| hidróxido de magnésio..... | 200 mg |
| simeticona..... | 30 mg |
| Excipiente QSP..... | 1 comprimido |

(amido, manitol, sacarina sódica di-hidratada, ciclamato de sódio, povidona, álcool etílico e estearato de magnésio).

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

1 - AÇÃO ESPERADA DO MEDICAMENTO:

Indicado como antiácido para alívio sintomático da hiperacidez associada com o diagnóstico de úlcera péptica, gastrite, esofagite e hérnia de hiato. Como antiflatulento para alívio dos sintomas de gases, inclusive quadros pós - operatórios.



Uma empresa do Grupo Lupin

2 - CUIDADOS DE ARMAZENAMENTO:

Conservar em local fresco (em temperatura entre 8°C e 15°C)

3 - PRAZO DE VALIDADE:

Data de fabricação, prazo de validade e nº do lote: vide cartucho.

NÃO SE DEVE UTILIZAR O PRODUTO ALÉM DO PRAZO ESTABELECIDO, SOB O RISCO DE NÃO PRODUZIR OS EFEITOS DESEJADOS.

4 - GRAVIDEZ E LACTAÇÃO:

“Informe seu médico a ocorrência de gravidez ou lactação na vigência do tratamento ou após o seu término.

INFORME AO SEU MÉDICO CASO ESTEJA AMAMENTANDO”.

5 - CUIDADOS DE ADMINISTRAÇÃO:

Os comprimidos deverão ser bem mastigados, não degluti-los por inteiro.

“Siga a orientação do seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento”.

6 - INTERRUPTÕES DO TRATAMENTO:

“Não interromper o tratamento sem o conhecimento de seu médico.”

7 - REAÇÕES ADVERSAS:

Doses excessivas podem provocar perturbações gastrintestinais como náuseas, vômitos e diarreia leve.

Informe seu médico o aparecimento de reações desagradáveis.

8-INGESTÃO CONCOMITANTE COM OUTRAS SUBSTÂNCIAS:

GASTROGEL® pode reduzir a absorção de certos fármacos (como tetraciclinas, fenitoína, digoxina, agentes hipoglicemiantes); por este motivo, deve ser administrado uma hora antes ou depois desses medicamentos.

9 - CONTRAINDICAÇÕES E PRECAUÇÕES:

O produto não deve ser usado por pacientes com hipersensibilidade aos componentes da fórmula. Pacientes com insuficiência renal só deverão utilizar o produto sob controle médico.

NÃO TOME REMÉDIO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO, PODE SER PERIGOSO PARA A SUA SAÚDE.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

GASTROGEL® é um antiácido e um antiflatulento em uma combinação balanceada de hidróxido de alumínio e de magnésio mais simeticona, que tem propriedades antiácidas e antiflatulentas, não constipantes. O hidróxido de alumínio e de magnésio possuem capacidade, amplamente conhecida, de neutralizar a acidez gástrica e sua associação com a simeticona, um polímero de sílica, de ação antiflatulenta, é importante no tratamento da aerofagia e da eliminação de gases excessivos acumulados no trato gastrintestinal, pois a formação de bolhas de gases neste segmento contribui para o aumento